

کد کنترل

420

A



آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) - سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

رشته قارچ شناسی - (کد ۲۷۱۷)

مدت پاسخ گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: - قارچ شناسی و بیماری ها - ایمنی شناسی - باکتری شناسی عمومی - ویروس شناسی و بیماری ها	۹۰	۱	۹۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخنامه ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

- ۱- Id reaction در کدام دسته از بیماران شایع تر است؟
 - (۱) کچلی سر با عامل میکروسپورم کنیس
 - (۲) کچلی ناخن با عامل تریکوفایتون ورکوزوم
 - (۳) کچلی کشاله ران با عامل اپی‌درموفایتون فلوکوزوم
 - (۴) کچلی پا با تریکوفایتون منتاگروفاتیس
- ۲- دکتین - ۱ فعالیت‌های بیولوژیکی کدام یک از اجزای قارچ را میانجی می‌نماید؟
 - (۱) زیموزان
 - (۲) کیتین
 - (۳) مانان
 - (۴) گلوکان
- ۳- جزء C3 کمپلمان به عنوان اپسونین برای کدام بیماری قارچی عمل می‌کند؟
 - (۱) هیستوپلازما کپسولاتوم
 - (۲) کاندیدا آلبیکانس
 - (۳) آسپرژیلوس فومیگاتوس
 - (۴) کریپتوکوکوس نئوفورمنس
- ۴- در کدام یک از روش‌های رنگ آمیزی، مخمرهای لوبوآ لوبوئی با سیتوپلاسم به رنگ زرد مایل به قهوه‌ای، هسته‌های به رنگ قهوه‌ای پررنگ و دیواره سلولی به رنگ صورتی رؤیت می‌شوند؟
 - (۱) اسید موکوپلی‌ساکارید
 - (۲) گریدلی
 - (۳) آلسین آبی
 - (۴) PAS
- ۵- کدام یک از موارد زیر در مورد آمفوتریسین ب صحیح است؟
 - (۱) غلظت‌های پائین و بالای آمفوتریسین ب خاصیت قارچ کشی دارند.
 - (۲) در غلظت‌های پائین آمفوتریسین ب قادر به افزایش بیگانه‌خواری ماکروفاژها می‌گردد.
 - (۳) با فعال نمودن لنفوسیت‌های Ts موجب تقویت سیستم ایمنی میزبان می‌شود.
 - (۴) قابلیت نفوذپذیری خوبی به داخل حفرات بدن دارد.
- ۶- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد مالاسزیا فورفور درست نمی‌باشد؟
 - (۱) قادر به سنتز اسیدمیرستیک می‌باشد.
 - (۲) ویتامین‌های گروه B رشد آن را تسریع می‌کند.
 - (۳) قادر به تبدیل اسیدچرب اشباع به انواع غیراشباع نیست.
 - (۴) قادر به متابولیزه کردن سولفات به عنوان منبع گوگرد نمی‌باشد.
- ۷- مهم‌ترین علت بقای هیستوپلازما کپسولاتوم درون ماکروفاژها کدام است؟
 - (۱) ترشح آنزیم کاتالاز
 - (۲) ممانعت از ادغام فاگوزوم با لیزوزوم
 - (۳) سنتز پروتئین شوک حرارتی
 - (۴) ترشح آنزیم سوپراکسید دیسموتاز
- ۸- برای تهیه کدام یک از نمونه‌های بدن نیاز به هپارین می‌باشد؟
 - (۱) مایع نخاع
 - (۲) ادرار
 - (۳) مغز استخوان
 - (۴) مایع زجاجیه

- ۹- از کدام یک از محیط‌های زیر برای تفریق سریع دو وارسته کریپتوکوکس نئوفورمنس از یکدیگر بکار می‌رود؟
 (۱) محیط ژلوز اوره (۲) محیط Yeast carbon Base حاوی D - پرولین
 (۳) ژلوز عصاره مخمر فسفات (۴) ژلوز دانه نیجر حاوی جنتامایسین
- ۱۰- پاساژ دوره‌ای جدایه‌های قارچی برای حفظ و نگهداری طولانی مدت کدام یک از قارچ‌ها توصیه می‌شود؟
 (۱) آسپرژیلوس ترئوس (۲) فیالوفورا وروکوزا
 (۳) تریکوفایتون روبروم (۴) بلاستومایسس درماتیتیدیس
- ۱۱- سلول پا (Foot cell) در میسلیم رویشی کدام قارچ زیر یافت می‌شود؟
 (۱) پنی سیلیوم (۲) آلترناریا (۳) بای پولاریس (۴) آسپرژیلوس
- ۱۲- کدام یک از گزینه‌های زیر برای آگار دانه پنبه (Cotton Seed agar) مناسب است؟
 (۱) تبدیل هایف بلاستومایسس درماتیتیدیس به شکل مخمری آن
 (۲) جهت نگهداری اشکال مخمری قارچ‌های دو شکلی
 (۳) جهت ایجاد اسفرول و اندوسپور کوکسیدیوئیدس ایمیتیس
 (۴) جهت کشت فاز مخمری پا راکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس
- ۱۳- سندرم چدیاک هیگاشی فرد را مستعد ابتلا به کدام بیماری قارچی زیر می‌نماید؟
 (۱) هیستوپلاسموزیس منتشر (۲) کاندیدیازیس جلدی مخاطی مزمن
 (۳) آسپرژیلوزیس مهاجم (۴) کریپتوکوکوزیس مغزی
- ۱۴- شرایط ارثی در استعداد به کدام قارچ زیر دخیل می‌باشد؟
 (۱) پزودوآلشریا بوئیدی (۲) هیستوپلاسما کپسولاتوم
 (۳) تریکوفایتون کنسانتریکوم (۴) اسپورتریکس شنکئی
- ۱۵- کدام یک از عوامل زیر، مهم‌ترین عامل در انتشار کچلی سر می‌باشد؟
 (۱) تماس بچه‌ها در مدارس (۲) تعداد پسرهای یک خانواده
 (۳) استفاده مشترک از وسایل شخصی (۴) استاندارد پائین بهداشت فردی
- ۱۶- کدام یک از موارد زیر در مورد اسپورتریکس شنکئی درست نمی‌باشد؟
 (۱) مقاوم به سیکلوهاگزامید است.
 (۲) دما در دایمورفسم قارچ مؤثر است.
 (۳) برای رشد نیاز به تیامین دارد.
 (۴) ایدورپتاسیم فعالیت قارچ‌کشی زیادی بر علیه اسپورتریکس در *in vitro* دارد.
- ۱۷- تست جلدی هیستوپلاسما کپسولاتوم با کدام قارچ زیر واکنش متقاطع دارد؟
 (۱) تریکوسپورون (۲) کرایزوسپوریوم (۳) اسپورتریکس (۴) کریپتوکوکوس
- ۱۸- در کدام یک از گونه‌های کاندیدایی زیر به ترتیب مقاومت ذاتی و اکتسابی نسبت به فلوکونازول ایجاد می‌شود؟
 (۱) کاندیدا آلیکانس - کاندیدا گلابراتا (۲) کاندیدا کروژئی - کاندیدا گلابراتا
 (۳) کاندیدا کروژئی - کاندیدا فاماتا (۴) کاندیدا کاندیدا گلابراتا - کاندیدا کروژئی
- ۱۹- ضایعات شبیه به همانژیوم در عفونت چشمی کدام قارچ مشاهده می‌گردد؟
 (۱) رینوسپوریوم سیری (۲) آلترناریا آلترناتا
 (۳) فوزاریوم سولانی (۴) کاندیدا آلیکسن

- ۲۰- کدام یک از درماتوفیت‌های زیر در محیط برنج به خوبی رشد کرده و ایجاد اسپور می‌نماید؟
 (۱) میکروسپوروم اودئینی (۲) میکروسپوروم جیپسئوم
 (۳) میکروسپوروم پرسیکالر (۴) میکروسپوروم فروژینوم
- ۲۱- فعالیت قارچ‌کشی فلوسایتوزین مربوط به دخالت کدام آنزیم‌های زیر است؟
 (۱) فعالیت تیمیدیلات سنتاز و عدم فعالیت دآمنیاز
 (۲) عدم فعالیت تیمیدیلات سنتاز و سیتوزین دآمنیاز
 (۳) عدم فعالیت تیمیدیلات سنتاز و فعالیت سیتوزین دآمنیاز
 (۴) فعالیت تیمیدیلات سنتاز و دآمنیاز
- ۲۲- کدام یک از روش‌های زیر برای کاهش اثرات آفات توکسین در جیره‌های غذایی عملی تر و مناسب‌تر است؟
 (۱) حرارت دادن (۲) اشعه دادن
 (۳) افزودن ساکارومایسس سرویسبه به جیره (۴) افزودن ترکیبات اسید و قلیایی به جیره
- ۲۳- اندازه‌گیری کدام آنتی‌ژن کاندیدایی موجب تفريق کاندیدایزيس ته‌اجمی از کلونیزاسیون کاندیدایی می‌شود؟
 (۱) آنولاز (۲) مانان (۳) B (۳ و ۱) گلوکان (۴) D - آرابینتول
- ۲۴- کدام یک از موارد زیر عامل مهار رشد درماتوفیت‌ها در سرم می‌باشد؟
 (۱) روی (۲) کلسترول (۳) ترانسفرین غیر اشباع (۴) آهن آزاد
- ۲۵- کدام یک از مطالب زیر در مورد مسمومیت با آفات توکسین صحیح نمی‌باشد؟
 (۱) کاهش زمان انعقاد خون (۲) افزایش نیاز به ویتامین D
 (۳) کاهش سنتز پروتئین (۴) کاهش همانندسازی DNA
- ۲۶- برای تشخیص آزمایشگاهی کدام یک از بیماری‌های زیر کشت نمونه‌ای بالینی فاقد ارزش می‌باشد؟
 (۱) درماتوفیتوزیس (۲) کروموبلاستوما یکوزیس (۳) هیستوپلاسموزیس (۴) رینوسپوریديوزیس
- ۲۷- کدام یک از مشخصات هیستوپاتولوژی فئوهایفورمایکوزیس می‌باشد؟
 (۱) هایف شفاف، آرتروکوییدی و مخمر (۲) مخمر، کلامیدوکونیدی و هایف کاذب
 (۳) هایف رنگی، مخمر و اسکلوروتیک بادی (۴) هایف رنگی، مخمر و کلامیدوکوییدی
- ۲۸- کدام یک از توکسین‌های زیر از مسیر موالونات ساخته می‌شود؟
 (۱) میتوکسین (۲) آفات توکسین (۳) اوکراتوکسین (۴) زیرالنون
- ۲۹- از کدام یک از تست‌های زیر برای تفريق اکتینوما یستوما از یوما یستوما استفاده می‌شود؟
 (۱) کانترایمونو الکتروفورز (۲) الایزا (۳) کیلمان فیکساسیون (۴) آگلوتیناسیون
- ۳۰- اسکوآموس سل کارسیتوما با کدام یک از بیماری‌های زیر اشتباه می‌شود؟
 (۱) لوبوما یکوزیس (۲) نوکار دیوزیس (۳) کروموبلاستوما یکوزیس (۴) کریپتوکوکوزیس
- ۳۱- کدام یک از عفونت‌های قارچی موجب مرگ و میر بیش از ۹۰ درصد در بیماران با پیوند مغز استخوان همراه بانوتروپنی پایدار و مقاوم می‌شود؟
 (۱) کریپتوکوکوزیس (۲) فوزاریوزیس (۳) کاندیدبازیس (۴) موکورمایکوزیس
- ۳۲- بیشترین میزان آسپرژیلوزیس در کدام گروه از بیماران پیوندی گزارش می‌شود؟
 (۱) پیوند مغز استخوان (۲) پیوند ریه (۳) پیوند قلب (۴) پیوند کلیه
- ۳۳- مشخصه آسپرژیلوزیس در بافت کدام است؟
 (۱) سلول‌های جوانه‌دار (۲) هایف منشعب (۳) هایف کاذب (۴) گرانول‌های متاکرومیک

- ۳۴- کتواسیدوز با چه مکانیسمی بیماران را مستعد موکور مایکوزیس می نماید؟
 (۱) کاهش سطح سرمی آهن آزاد
 (۲) در دسترس قرار گرفتن سریع تر آهن توسط قارچ
 (۳) افزایش اتصال آهن به فریتین خون
 (۴) کاهش اتصال آهن به سیدروفور خون
- ۳۵- کدام یک از ترکیبات زیر موجب تحریک رشد و جوانه زدن اندوسپورهای کوکسیدیوئیدس ایمیتیس می گردد؟
 (۱) پروژسترون ترکیبی و ۱۴ بتا استرادیول
 (۲) پروژسترون آزاد و ۱۷ آلفا استرادیول
 (۳) پروژسترون آزاد و ۱۴ آلفا استرادیول
 (۴) پروژسترون آزاد و ۱۷ بتا استرادیول
- ۳۶- شکل های فاقد جوانه هیستوپلازما کپسولاتوم در مقاطع بافتی رنگ شده با GMS شبیه کدام یک از اجرام زیر است؟
 (۱) کیست پنوموسیستیس کارینی
 (۲) گلبول قرمز
 (۳) کاندیدا گلا براتا
 (۴) اماسیتگوت
- ۳۷- کدام یک از مخمرهای زیر به شکل دو سلولی یا شکل ۸ در مقاطع بافتی دیده می شود؟
 (۱) بلاستوما یسس درماتیتیدیس
 (۲) لوبوآ لوبوئی
 (۳) واریته دوبروئیزی هیستوپلازما کپسولاتوم
 (۴) پنی سیلیوم مارنفئی
- ۳۸- تحریک کراتینوسیت ها با تریکوفیتین موجب تولید فعال کدام سایتوکاین زیر می گردد؟
 (۱) IL-۸ (۲) IL-۳ (۳) IL-۱۰ (۴) IL-۱۳
- ۳۹- کدام یک از واکنش های زیر در مقاطع هیستوپاتولوژی اجسام اسکروتیک بیماری کروموبلاستوما یکوزیس دیده می شود؟
 (۱) میکروآیسه متعدد منتشر
 (۲) واکنش گرانولوماتوز مخلوط
 (۳) فیروز بینابینی
 (۴) واکنش نکروز کازئوز چرکی
- ۴۰- کدام یک از ویژگی های مایستوما ی کاذب (سودوما یستوما) می باشد؟
 (۱) فاقد اسکروتیا، فاقد عوامل قارچی
 (۲) واجد اسکروتیا، فاقد تورم
 (۳) فاقد اسکروتیا، واجد قرحه و ترشح
 (۴) واجد اسکروتیا، فاقد ترشح و قرحه
- ۴۱- داروی انتخابی برای درمان فرم جلدی - لنفاوی اسپوروتریکوزیس کدام است؟
 (۱) آمفوتریسین ب (۲) کتوکونازول (۳) فلوکونازول (۴) ایتراکونازول
- ۴۲- کدام یک از ترکیبات زیر موجب پیوند و سازماندهی ترکیبات مختلف دیواره سلولی قارچ ها می گردد؟
 (۱) کیتین (۲) B (۶ و ۱) گلوکان (۳) گالاتومانان (۴) B (۳ و ۱) گلوکان
- ۴۳- اجسام گچی (Calicific body) در بافت، با کدام یک از قارچ های زیر اشتباه می شوند؟
 (۱) کریپتوکوکوس نئوفورمنس
 (۲) کاندیدا تروپیکالیس
 (۳) کاندیدا آلیکانس
 (۴) کاندیدا اکروژی
- ۴۴- اسپوندیلت انکیلوزان از عوامل خطر کدام شکل از بیماری آسپرویلوزیس است؟
 (۱) آلوئولیت اسکترنسیک آلرژیک
 (۲) آسپرژیلوما
 (۳) ABPA
 (۴) آسپرژیلوزیس مهاجم
- ۴۵- کدام یک از عوامل حدت آسپرژیلوس فومیگاتوس نمی باشد؟
 (۱) پروتئاز (۲) B (۳ و ۱) گلوکان (۳) ریپوتوکسین (۴) کاتالاز
- ۴۶- از بین گونه های کاندیدا کدام یک در محیط کروم آگار ایجاد کلونی صورتی رنگ می نمایند؟
 (۱) کاندیدا کروژی (۲) کاندیدا گیلرموندی (۳) کاندیدا تروپیکالیس (۴) کاندیدا آلیکانس
- ۴۷- کدام یک از توکسین های زیر ایجاد اختلال گوارشی می نماید؟
 (۱) آفلاتوکسین (۲) اوکراتوکسین (۳) ومیتوکسین (۴) روبراتوکسین

- ۴۸- شکل مخمری موکور سیرسینلوئیدس در نمونه‌های بالینی مایع با کدام قارچ زیر اشتباه می‌شود؟
 (۱) پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس
 (۲) کاندیدا کروژنی
 (۳) واریته کپسولاتوم هیستوپلاسما
 (۴) ساکارومایسس سرویسیه
- ۴۹- کدام یک از عوامل زیر از ویژگی‌های جنس مالاسزیا می‌باشد؟
 (۱) جوانه‌های چند قطبی انتروبلستیک
 (۲) اوره‌آز منفی
 (۳) قرابت زیاد با آسکومیست‌ها
 (۴) القای رشد با کلسترو و استرهای آن
- ۵۰- مهم‌ترین آلرژن پروتئینی پنی سیلیوم کرایزوژنوم و اسپرژیلوس فلاوس به ترتیب کدام‌اند؟
 (۱) ASP fl_۱, Pen ch_{۳۲}
 (۲) ASP fl_{۱۳}, Pen ch_{۱۳}
 (۳) ASP fl_۶, Pen ch_{۵۴}
 (۴) ASP fl_{۱۶}, Pen ch_{۱۰}
- ۵۱- در صورتی که در آزمون EIA تیتراژ آنتی بادی ۸: ۱ علیه بلاستومایسس درماتیتیدس به دست آمده باشد، نتیجه آزمایش چگونه تفسیر می‌شود؟
 (۱) با توجه به تیتراژ، فرد مبتلا به بلاستومایکوزیس نیست.
 (۲) با توجه به تیتراژ، فرد مبتلا به بلاستومایکوزیس است.
 (۳) با توجه به تیتراژ، نیاز به تکرار آزمایش یا تست تکمیلی است.
 (۴) با توجه به تیتراژ، فرد سابقه تماس با قارچ را دارد.
- ۵۲- از بین گونه‌های زیر کدام یک بر روی محیط مایکوسل آگار رشد می‌کند؟
 (۱) اسپرژیلوس فومیگاتوس (۲) تریکوفایتون وروکوزوم (۳) کاندیدا آلبیکانس (۴) تریکوسپورون بژلی
- ۵۳- شایع‌ترین عامل کراتیت قارچی کدام است؟
 (۱) آلتوناریا التوناتا (۲) کاندیدا آلبیکانس (۳) اسپرژیلوس نایجر (۴) فوزاریوم سولانی
- ۵۴- کدام یک از گونه‌های درماتوفیتی زیر قادر به تغییر رنگ محیط DTM نیست؟
 (۱) تریکوفایتون روبروم (۲) تریکوفایتون وروکوزوم (۳) تریکوفایتون متاگروفایتیس (۴) تریکوفایتون متاگروفایتیس
- ۵۵- کدام یک از محیط‌های کشت زیر جهت ایجاد فاز مخمری اسپوروتریکس شکئی استفاده می‌شود؟
 (۱) سابورو دکستر در آگار (۲) مالت اکسترکت آگار (۳) کورن میل آگار (۴) برین هارت اینفیوژن آگار
- ۵۶- کدام یک از بیماری‌های قارچی زیر از طریق گاز گرفتگی سگ به انسان منتقل می‌شود؟
 (۱) مایستوما (۲) کاندیدایازیس (۳) اسپوروتریکوزیس (۴) فتوهایفومایکوزیس
- ۵۷- کدام یک از قارچ‌های زیر در بافت ظاهری شبیه اسپرژیلوس فومیگاتوس دارند؟
 (۱) رایزوپوس اوریزا (۲) کاندیدا گلابراتا (۳) فوزاریوم سولانی (۴) آبسیدیا کوریمبفرا
- ۵۸- روش‌های سرولوژی در تشخیص کدام یک از بیماری‌های زیر کاربرد ندارد؟
 (۱) کریپتوکوکوزیس (۲) موکور مایکوزیس (۳) اسپرژیلوزیس (۴) کاندیدایازیس
- ۵۹- در تشخیص سرولوژی کدام شکل از اسپرژیلوزیس باندهای رسوبی قوی‌تری مشاهده می‌شود؟
 (۱) اسپرژیلوزیس مهاجم (۲) اسپرژیلوما (۳) اسپرژیلوزیس برونکوپالمونری آلرژیک (۴) آسم اکسترنسیک
- ۶۰- کدام یک از قارچ‌های زیر به سیلکوهگزامید مقاوم است؟
 (۱) کریپتوکوکوس نئوفورمنس (۲) اسپرژیلوس فومیگاتوس (۳) سودوآلشریا بوئیدی (۴) آبسیدیا کوریمبفرا

- ۶۱- کدام مولکول نقش مرکزی در عرضه پادگن دارد؟
 (۱) TcR (۲) MHC (۳) TLR (۴) BcR
- ۶۲- کدام یک از جملات زیر صحیح است؟
 (۱) یک پلاسما سل قادر است چند نوع ایدیوتایپ بسازد.
 (۲) همه یاخته های B امکان تبدیل تولید IgG به IgE را دارند.
 (۳) در پدیده تعویض کلاس ایمنوگلوبولین ایدیوتایپ تغییر می کند.
 (۴) شناخت پادگن توسط لمفوسیت B به تنهایی برای تولید IgE کافی نیست.
- ۶۳- الگوی مهم مولکولی مربوط به قارچ های پاتوژن کدام است؟
 (۱) فلاژلین (۲) LPS (۳) β -glucans (۴) Formylated methionine groups
- ۶۴- برای نامگذاری Chemokine از کدام علامت استفاده می شود؟
 (۱) CXC (۲) CCX (۳) CDC (۴) XCC
- ۶۵- Toll like receptors5 کدام مولکول ها را می شناسد؟
 (۱) CpG موتیف (۲) انترفرن گاما (۳) فلاژلین (۴) LPS
- ۶۶- منشا یاخته های DC2 کدام است؟
 (۱) استئوکلاست (۲) لمفوئیدی (۳) میلوئیدی (۴) اریترئوئیدی
- ۶۷- کدام نوع آنتی ژن معمولاً به لمفوسیت های $TCD4^+$ عرضه می شود؟
 (۱) برونژاد (۲) درونژاد (۳) اتولوگوس (۴) سیتوزولیک
- ۶۸- مغز استخوان چه نوعی از ارگان لمفاوی است؟
 (۱) منتشر (۲) مرکزی و اطراف (۳) صرفاً مرکزی (۴) صرفاً اطراف
- ۶۹- کدام انترلوکین در تمایز یاخته های B نقش دارد؟
 (۱) Interleukin-8 (۲) Interleukin-17 (۳) Interleukin-7 (۴) Interleukin-6
- ۷۰- کدام سازوکار تنوع ژنی پادتن بیشتر از همه در پرندگان رخ می دهد؟
 (۱) Junctional diversity (۲) Combinational diversity (۳) Gene rearrangement (۴) Gene conversion
- ۷۱- تفاوت پاسخ هومورال اولیه با ثانویه در وجود کدام فاز است؟
 (۱) Waxing (۲) Log (۳) Lag (۴) Waning
- ۷۲- کدام یاخته ها پرفورین تولید می کنند؟
 (۱) TDTH & TCD4 (۲) TCD8 & NK (۳) TCD4 & NK (۴) TDTH & TCD8
- ۷۳- کدام یک از اجزای عامل مکمل در التهاب دخالت دارند؟
 (۱) C3a و C5a (۲) C2a و C4a (۳) Clq و Clr (۴) C8a و C9a
- ۷۴- جزء C۴ عامل مکمل در ابتدای کدام مسیر فعال می شود؟
 (۱) MBL (۲) Classic (۳) Alternative (۴) Tick over
- ۷۵- انترفرن گاما کدام مسیر ایمنی را تقویت می کند؟
 (۱) ایمنی هومورال و ازدیاد حساسیت (۲) ایمنی سلولی و خودایمنی (۳) ایمنی هومورال و خودایمنی (۴) ایمنی سلولی و ازدیاد حساسیت

- ۷۶- آلبومین جزو کدام گروه پروتئین‌های فاز حاد است؟
 (۱) منفی (۲) مثبت (۳) ثابت (۴) متغیر
- ۷۷- کمبود کدام مولکول باعث رخداد رسوب ایمنی می‌شود؟
 (۱) فیبرینوژن (۲) عامل مکمل (۳) دیفنسین (۴) میلوپراکسیداز
- ۷۸- حساسیت کدام روش سرولوژی بیشتر است؟
 (۱) الیزا (۲) هم‌آگلوتیناسیون (۳) ایمونودیفریون (۴) آگلوتیناسیون
- ۷۹- پادگن‌های گروه خونی در کدام گروه قرار دارند؟
 (۱) اتو (۲) آلو (۳) هترو (۴) گزنو
- ۸۰- در کدام مورد پادگن در یک غشای لیپیدی قرار داده می‌شود؟
 (۱) فروند ناقص (۲) ایسکوم (۳) آلوم (۴) فروند کامل
- ۸۱- کدام یک از انواع تخمیر وابسته به آنزیم فسفوکتولاز است؟
 (۱) همولاکتیک (۲) الکلی (۳) هترولاکتیک (۴) بوتیریک
- ۸۲- ارتباط دهنده‌های زنجیره انتقال الکترون در یوکاریوت‌ها هستند.
 (۱) سیتوکروم a و b (۲) کوآنزیم Q و سیتوکروم C
 (۳) کوآنزیم Q و سیتوکروم b (۴) کوآنزیم Q و سیتوکروم a
- ۸۳- کدام عبارت زیر در مورد فعال نشدن ترمیم SOS صحیح می‌باشد؟
 (۱) فعال شدن آن پس از اتصال RecA به LexA روی دو رشته DNA صورت می‌گیرد.
 (۲) هنگامی فعال می‌شود که پروتئین LexA به DNA تک رشته‌ای متصل شود.
 (۳) هنگامی فعال می‌شود که DNA تک رشته‌ای و آسیب دیده باشد.
 (۴) پس از فعال شدن، همانندسازی DNA بدون اشتباه خواهد بود.
- ۸۴- آنزیم‌های Lyase (لیاز) چه عملی را انجام می‌دهند؟
 (۱) ایجاد باند دوگانه (۲) تغییر آرایش مولکولی
 (۳) اکسیداسیون و احیاء (۴) انتقال گروه ۱ از یک مولکول به مولکول دیگر
- ۸۵- کدام ویژگی باعث افتراق باکتری جنس نوکاردیا از بقیه باکتری‌های رده اکتینوباکتری‌ها می‌گردد؟
 (۱) کند رشد بودن (۲) شکل رشته‌ای منشعب
 (۳) بی‌هوازی و غیرمتحرک (۴) رشد در محیط کشت سابرودکستروز آگار
- ۸۶- کدام خانواده ویروسی اندازه ویروس‌های بزرگتری دارد؟
 (۱) پاکس‌ویریده (۲) پاروویریده (۳) سیرکوویریده (۴) پیکورناویریده
- ۸۷- کدام یک از ویروس‌ها اونکوژن نیستند؟
 (۱) هپادنا ویروس (۲) آدنو ویروس (۳) پارو ویروس (۴) هرپس ویروس
- ۸۸- کدام ویروس دارای ژنوم قطعه قطعه نمی‌باشد؟
 (۱) آنفلوانزا (۲) گامبورو (۳) تب کریمه - کنگو (۴) طاعون گاوی
- ۸۹- کدام یک از ویروس‌ها از نظر تقارن و اسید نوکلئیک با بقیه متفاوت است؟
 (۱) ویروس تورم دهان و زیکولی (طاوولی) (۲) ویروس تب دره ریفت
 (۳) ویروس تب برفکی (۴) ویروس ماریبورگ
- ۹۰- در کدام یک از خانواده‌های ویروسی می‌توان آربوویروس‌ها را جستجو کرد؟
 (۱) کلیسی ویریده (۲) آستروویریده (۳) بونی‌اویریده (۴) پاپیلوماویریده